

**Lacrifilm®.** (carmelose sódica). **Solução Oftálmica Estérel. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:** Solução Oftálmica Estérel 5mg/mL: embalagem contendo frasco de 10 mL ou 15 mL. **USO ADULTO. USO OFTÁLMICO. COMPOSIÇÃO:** Cada mL contém: carmelose sódica-5 mg .Veículo: cloreto de sódio, fosfato de sódio, ácido bórico, perborato de sódio, ácido clorídrico e água para injetáveis. **INFORMAÇÕES AO PACIENTE. AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:** Lacrifilm® é uma solução que apresenta composição muito semelhante à composição das lágrimas naturais. Este medicamento é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o desconforto que pode estar associado com a utilização de lentes de contato. **REAÇÕES ADVERSAS:** Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES:** Lacrifilm® é contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. **NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE. INDICAÇÕES:** Lacrifilm® é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e também como protetor contra irritações oculares. É também indicado como lubrificante e re-umidificante durante o uso de lentes de contato. **CONTRAINDICAÇÕES:** O produto está contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** Evite o contato do conta-gotas do frasco com qualquer superfície para evitar contaminação. Não permitir que a ponta do frasco entre em contato direto com os olhos. Mantenha a tampa do frasco bem fechada após o seu uso. Manter o produto fora do alcance das crianças. Armazenar em temperatura ambiente. Em caso de aparecimento de dor, alterações da visão, ou se ocorrer piora ou persistência da vermelhidão, ou da irritação dos olhos, por mais de 72h após início de uso do produto, descontinuar o tratamento e procurar auxílio médico. Não utilizar o produto se ocorrer modificação da coloração da solução ou se a solução se tornar turva. **Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** rações com outros medicamentos. **REAÇÕES ADVERSAS:** Não foram detectadas reações adversas com o uso do Lacrifilm®. **POSOLOGIA:** Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olhos(s) afetado(s), tantas vezes quantas forem necessárias. **SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.** Registro MS - 1.0497.1289.