

TROPINOM® (tropicamida) **INDICAÇÕES:** Tropinom® é indicado como midriático e cicloplégico. **CONTRAINDICAÇÕES:** O produto é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula e em pacientes sob suspeita ou acometidos de glaucoma de ângulo fechado. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Gerais: deve-se tomar cuidado quando a pressão intraocular é alta ou desconhecida e quando a câmara anterior é rasa. Os midriáticos e cicloplégicos devem ser usados com muita cautela em pessoas idosas, ou outras de qualquer idade, que tenham potencial para o aumento na pressão intraocular. Deve-se proceder a um exame do ângulo da câmara anterior a fim de evitar uma crise de glaucoma de ângulo fechado. Deve-se também comprimir o saco lacrimal por um minuto logo após a instilação para evitar uma absorção sistêmica excessiva. O cloreto de benzalcônio, conservante utilizado na formulação do produto, pode ser absorvido por lentes de contato gelatinosas. Portanto, o produto não deve ser administrado quando essas lentes estiverem sendo utilizadas. As lentes devem ser removidas antes da aplicação das gotas e só devem ser recolocadas 15 minutos depois. A ponta do gotejador não deve tocar os olhos do paciente ou qualquer outra superfície, para evitar contaminação. Enquanto estiver com a pupila dilatada o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas e deve proteger os olhos da iluminação excessiva. **Gravidez:** não foram realizados estudos em humanos e animais. **Amamentação:** não foram documentados problemas em humanos. **Pediatria:** a susceptibilidade aumentada da tropicamida e fármacos similares (como a atropina) foi relatada em crianças, crianças pequenas e crianças com cabelos loiros, olhos azuis, síndrome de Down, paralisia espástica ou dano cerebral, portanto a tropicamida deve ser usada com muita cautela nesses pacientes. Este pode causar reações psicóticas, distúrbios comportamentais e colapso cardiorrespiratório, especialmente em crianças. **Idosos:** são mais suscetíveis aos efeitos da tropicamida e fármacos similares (como a atropina), levando ao aumento potencial de efeitos adversos sistêmicos; além disso, os pacientes idosos podem apresentar predisposição não diagnosticada a glaucoma de ângulo fechado, portanto a tropicamida deve ser usada com cautela nesses pacientes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** amantadina: aumento dos efeitos colaterais dos anticolinérgicos em geral; cisaprida: o uso concomitante com agente anticolinérgico pode reduzir a motilidade gastrointestinal induzida pela cisaprida; nitrofurantoína: aumento da biodisponibilidade de nitrofurantoína devido à diminuição da motilidade intestinal induzida pelos anticolinérgicos em geral. **POSOLOGIA:** Este medicamento só deve ser instilado por um profissional de saúde. Crianças: instilar 1 gota de Tropinom®. Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser instilada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático. **Adultos:** instilar 1 ou 2 gotas de Tropinom®. Decorridos 5 minutos, instilar mais 1 ou 2 gotas. Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser instilada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático. Deve-se comprimir o saco lacrimal por um minuto logo após a instilação para evitar uma absorção sistêmica excessiva. Os pacientes com íris fortemente pigmentada podem precisar de doses maiores. **REAÇÕES ADVERSAS:** Aumento da pressão intraocular. Reações psicóticas e distúrbios do comportamento, colapso cardiorrespiratório em crianças e em alguns adultos foram relatados com o uso de drogas desta classe. Outros sintomas como: ardor passageiro, boca seca, visão borrada, fotofobia com ou sem coloração corneana, taquicardia, cefaleia, estimulações parassimpáticas ou reações alérgicas também podem ocorrer. **SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** Registro MS – 1.0497.1270.